

DER MILCHZAHN IST ABGEBROCHEN

Sollte eine Ecke des Zahnes fehlen, stellen Sie sich innerhalb der nächsten drei Tage bei einem Zahnarzt vor.
Bei akuten Beschwerden oder Blutung aus dem Zahn stellen sich sich bitte noch am selben Tag bei einem Zahnarzt vor.

Das abgebrochene Zahnfragment wird meistens nicht wieder befestigt und muss daher nicht mitgebracht werden.

DER MILCHZAHN IST ANGESCHLAGEN, LOCKER ODER VERSCHOBEN

Der Zahn ist berührungsempfindlich, locker oder verschoben?
Dann schonen Sie den Zahn und kühlen Sie die betroffene Stelle. Vermeiden Sie es, an dem Zahn zu wackeln oder in seine ursprüngliche Position zu drücken.

Stellen Sie sich spätestens am nächsten Tag bei einem Zahnarzt vor und lassen Sie den Zahn untersuchen.





DER MILCHZAHN IST AUSGESCHLAGEN

Der komplette Milchzahn ist ausgefallen?
Versuchen Sie die Blutung zu stillen, indem Sie Ihr Kind auf ein sauberes Tuch beißen lassen. Kühlen Sie die betroffene Stelle und suchen Sie zeitnah einen Zahnarzt auf.

Ausgeschlagene Milchzähne werden nicht wieder eingesetzt.
Trotzdem sollten Sie die Verletzung zeitnah untersuchen lassen.

Wussten Sie...

...dass fast 2/3 der Kinder einen Zahnunfall vor dem 16. Lebensjahr erleiden?



... mehr als 50% dieser Unfälle die Milchzähne betreffen?



... Milchzahnunfälle besonder häufig im 3.-4. Lebensjahr auftreten?



Prof. Dr. med. dent Andreas Filippi, OA Dr. med. dent. Gabriel Krastl: Traumatologie im Milch- und Wechselgebiss.

KONTAKT

09131 - 923 18 10

Hofmannstraße 32
91052 Erlangen

www.seasmile.de

Seasmile


online Termin buchen

zahnärztlicher Notdienst

seasmile
DIE ZAHNARZTPRAXIS FÜR KIDS & TEENS

ZAHN-UNFALL

so reagieren Sie richtig!



Milchzähne

www.seasmile.de